

PROSPECTO:

ENDOGARD COMPRIMIDOS PARA PERROS GRANDES

1. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y FABRICANTE RESPONSABLE DE LA LIBERACIÓN DE LOS LOTES, EN CASO DE QUE SEAN DIFERENTES.

Titular de la autorización de comercialización:

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Eslovenia

Fabricante responsable de la liberación del lote:

KRKA - FARMA d.o.o., V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko, Croacia
Virbac S.A., 1ere Avenue, 2065M, LID, 06516 Carros Cedex, Francia
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Eslovenia

2. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Endogard Comprimidos para perros grandes
Prazicuantel, pirantel embonato, febantel

3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LAS SUSTANCIAS ACTIVAS Y OTRAS SUSTANCIAS

Cada comprimido contiene:

Prazicuantel	175 mg
Pirantel embonato	504 mg
Febantel	525 mg

Comprimidos ovalados, biconvexos, de color amarillo ligeramente verdaceo y bordes biselados y marcados por las dos caras.

Los comprimidos se pueden dividir en dos partes iguales.

4. INDICACIONES DE USO

Para el tratamiento de infestaciones mixtas con los siguientes nematodos y cestodos en perros adultos:

Nematodos

Áscaridos: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina* (forma inmadura tardía y forma madura)

Anquilostomas: *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum* (adultos)

Cestodos

Tenias *Taenia* spp., *Dipylidium caninum*

5. CONTRAINDICACIONES

No usar simultáneamente con compuestos piperazínicos.

No usar en animales que tengan hipersensibilidad conocida a las sustancias activas o a cualquiera de los excipientes.

No superar la dosis establecida al tratar a hembras gestantes.

6. REACCIONES ADVERSAS

En casos muy raros pueden producirse vómitos, con o sin diarrea.

La frecuencia de las reacciones adversas se debe clasificar conforme a los siguientes grupos:

- Muy frecuentemente (más de 1 animal por cada 10 presenta reacciones adversas durante un tratamiento)
- Frecuentemente (más de 1 pero menos de 10 animales por cada 100)
- Infrecuentemente (más de 1 pero menos de 10 animales por cada 1.000)
- En raras ocasiones (más de 1 pero menos de 10 animales por cada 10.000)
- En muy raras ocasiones (menos de 1 animal por cada 10.000, incluyendo casos aislados).

Si observa cualquier efecto de gravedad o no mencionado en este prospecto, le rogamos informe del mismo a su veterinario.

7. ESPECIES DE DESTINO

Perros (grandes y muy grandes)

8. POSOLOGIA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VIA DE ADMINISTRACIÓN

Para administración oral.

Las dosis recomendadas son: 15 mg/kg de peso de febantel, 14,4 mg/kg de pirantel y 5 mg/kg prazicuantel. Esto equivale a 1 comprimido por cada 35 kg de peso.

Los comprimidos se pueden dividir en dos partes iguales.

No hace falta restringir el acceso a la comida ni antes ni después de la administración del medicamento.

El comprimido se puede dar directamente al perro o disimulado en la comida.

9. INSTRUCCIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

Para asegurar la administración de la dosis correcta, se debe determinar el peso con la mayor precisión posible.

Para el control de *Toxocara*, las perras que han parido deben ser tratadas 2 semanas después del parto y cada 2 semanas hasta el destete.

En el caso de infestación por un nematodo con alta carga parasitaria, se debería repetir la dosis tras 14 días.

Para un control rutinario se recomienda una dosis única a intervalos de 3 meses.

10. TIEMPO DE ESPERA

No procede.

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación

No utilice este medicamento veterinario después de la fecha de caducidad que aparece en la caja después de {CAD/EXP}. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

12. ADVERTENCIAS ESPECIALES

Advertencias especiales para cada especie:

Las pulgas sirven de huésped intermediario para el cestodo *Dipylidium caninum*. La infestación por cestodos es probable que suceda a no ser que se controle a hospedadores intermedios como pulgas, ratones, etc.

Precauciones especiales para su uso en animales:

Los comprimidos parcialmente usados deben desecharse.

No se recomienda su uso en perros que pesen menos de 17,5 Kg..

Precauciones especiales que debe tomar la persona que administre los medicamentos veterinarios a los animales:

Para una correcta higiene, las personas que administren los comprimidos directamente al perro o la añadan a la comida del perro, deberán lavarse las manos después de hacerlo.

En caso de ingestión accidental, consulte con un médico y muéstrole el prospecto o la etiqueta.

Uso durante la gestación y lactancia:

Consulte a un veterinario antes de desparasitar animales gestantes.

Este medicamento se puede utilizar durante la lactancia.

No usar en perras durante los dos primeros tercios de gestación.

Interacciones con otros medicamentos y o otras formas de interacción:

No usar simultáneamente con piperazinas ya que los efectos antihelmínticos del pirantel y piperazina (usados en muchos nematocidas en perros) pueden ser antagonistas.

El uso concurrente con otros compuestos colinérgicos puede producir toxicidad.

Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos):

El producto es bien tolerado en perros. En los estudios de seguridad, dosis de hasta cinco veces la dosis recomendada produjeron vómitos ocasionales.

13. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

14. FECHA EN QUE FUE APROBADO EL PROSPECTO POR ÚLTIMA VEZ

Marzo de 2019

15. INFORMACIÓN ADICIONAL

Formatos:

Caja que contiene un blíster Alu-Alu impreso y perforado con 2 comprimidos (1 blíster con 2 comprimidos).

Caja que contiene blísteres Alu-Alu impresos y perforados con 4 comprimidos (2 blísteres con 2 comprimidos)..

Caja que contiene un blíster Alu-Alu impreso y perforado con 10 comprimidos (1 blíster con 10 comprimidos).

Caja que contiene blísteres Alu-Alu impresos y perforados con 12 comprimidos (2 blíster con 6 comprimidos).

Caja que contiene blísteres Alu-Alu impresos y perforados con 24 comprimidos (4 blíster con 6 comprimidos).

Caja que contiene blísteres Alu-Alu impresos y perforados con 30 comprimidos (3 blísteres con 10 comprimidos).

Caja que contiene blísteres Alu-Alu impresos y perforados con 50 comprimidos (5 blísteres con 10 comprimidos).

Blíster Alu-Alu impreso y perforado: 60 comprimidos (10 blísteres con 6 comprimidos o 6 blísteres con 10 comprimidos), en una caja

Caja que contiene blísteres Alu-Alu impresos y perforados con 100 comprimidos (10 blísteres con 10 comprimidos).

Caja que contiene blísteres Alu-Alu impresos y perforados con 102 comprimidos (17 blísteres con 6 comprimidos).

Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Representante:

Virbac España S.A.

ES-08950

Esplugues de Llobregat (Barcelona)

España

***Válido sólo para el envase de 60 comprimidos**

1 por 35 kg

SELLO DE USO

Nombre del dueño:

Nombre de la mascota:.....

Dosis: